

Pic épeiche

Dendrocopos major - Great Spotted Woodpecker

Identification :



C'est le plus commun et le plus répandu des pics bigarrés dans son *aire* de répartition.

Son plumage est noir et blanc et le bas-ventre rouge vif. Chez le mâle, un carré rouge est présent sur la nuque tandis que chez la femelle la *calotte* est entièrement noire. Les jeunes ont la *calotte* entièrement rouge, souvent striée, ce qui peut parfois porter à confusion avec le *pic mar*.

Le dos est noir sauf une grande tache blanche visible de chaque côté.

Le *bec* puissant et pointu est noir. Les yeux sont foncés, entourés d'une fine bande blanche.

La langue des pics épeiches est effilée, très longue, visqueuse et pourvue de nombreux corpuscules, dont l'extrémité petite, plate et pointue, est ornée de petits crochets. Elle peut-être projetée loin en avant.



Les *pattes* et les *doigts zygodactyles* sont grisâtres. Les *tarses* sont courts et les *doigts* pourvus d'*ongles* solides et recourbés. Deux sont dirigés en avant et deux en arrière, ils leur permettent de grimper facilement aux arbres tout en prenant appui sur les *plumes* de la queue, excessivement robustes.

Chant : Le pic épeiche a pour cri typique une note explosive courte, sèche et haut-perchée "Kix". Il émet aussi des "chick" plus doux et plus bas.

Contrairement aux oiseaux chanteurs, le pic épeiche utilise les tambourinages comme moyen de communication, notamment pendant les *parades* territoriales de février à mai. La cadence est de 5 à 20 coups de *bec* par seconde avec une fréquence de 5 à 6 tambourinages par minute. Un mâle non accouplé peut tambouriner jusqu'à 600 fois par jour.

Habitat : Le pic épeiche vit dans les forêts et les zones boisées de toutes sortes, les *haies* d'arbres, les vergers, les parcs et les grands jardins.

Distribution : Son *aire* de répartition s'étend de la taïga arctique jusqu'aux régions méditerranéennes.

Comportements : Le pic épeiche se nourrit plutôt dans les arbres, sur les troncs et les grandes branches. Il peut aussi se nourrir sur le sol, mais c'est plus rare. Il ne s'éloigne jamais des arbres. Il travaille en allant vers le haut du tronc, mais aussi d'un côté à l'autre, tapant dans l'écorce pour extraire la nourriture des crevasses avec le bout de sa langue collante. Il tourne autour du tronc, sans doute pour ne pas se laisser observer.

Les vols de *parade* sont effectués par les deux adultes. Ils volent en décrivant des spirales, et ensuite, ils se posent très près du tronc avec les *ailes* semi-ouvertes et tremblotantes.

Vol : Le pic épeiche a un vol puissant et ondulant.



Nidification : Le pic épeiche niche dans des cavités creusées par les deux adultes, en mars et avril.

La femelle dépose 4 à 7 oeufs blancs, entre la mi-mai et début juin. L'incubation dure environ 16 jours, assurée par la femelle dans la journée, et par le mâle la nuit. Les poussins sont *nidicoles* et sont nourris par les deux parents. Ils quittent le nid à l'âge de 18 à 21 jours.

Régime : Ce pic a une nourriture très variée, constituée de petits invertébrés, de graines et de fruits. A la bonne saison, il consomme essentiellement des *insectes* qu'il trouve en explorant les troncs et les branches, et le lichen des acacias à l'arrière saison. Il ne dédaigne pas les *nichées* d'autres cavernicoles telles les mésanges.

Protection / Menaces : Le pic épeiche est commun et largement répandu, mais la déforestation est la menace la plus importante qui pèse sur lui.

Sources :

◦ IOC World Bird List (v3.5), *Gill, F and D Donsker (Eds). 2012.*

PIC ÉPEICHE

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Ordre : Piciformes

Famille : Picidés

Genre : Dendrocopos

Espèce : major

Sous-espèces : 24 [+]

Chant :

Biométrie :

Taille : 24 cm

Envergure : 34 à 39 cm.




00:00 00:00

- Didier Collin ©
- Didier Collin ©
- Didier Collin ©
- Didier Collin ©
- Jean-Claude Roché ©


Poids : 70 à 98 g

Longévité : 11 ans

Statut de conservation IUCN :



Distribution :



Synonymes : strakapoud veľký (cs), Stor Flagspætte (da), Buntspecht (de), Great Spotted Woodpecker (en), Pico Picapinos (es), kápytikka (fi), Nagy fakopáncs (hu), Picchio rosso maggiore (it), アカゲラ (ja), Flaggspett (nb), Grote Bonte Specht (nl), dzięcioł duży (pl), Pica-pau-malhado-grande (pt), Большой пестрый дятел (ru), ďateľ veľký (sk), Större hackspett (sv), 大斑啄木鸟 (zh)

Autres liens :

D'après Buffon : *LES PICS.*

lucn

Birdlife

Avibase

Hbw Alive



Fiche créée le 07/11/2002 par *Didier Collin*



[A propos](#) | [Nous aider](#) | [Mentions légales](#) | [Sources](#) | [Contacts](#) | [Version imprimable](#)

Mis à jour le 22/05/2014 04:33:11 - © 1996-2014 Oiseaux.net